

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

CARBOCISTEIN 200 mg

GMP WHO

THUỐC CÓM PHA HỖN DỊCH UỐNG

THÀNH PHẦN:

Mỗi gói chứa: Carbocistein 200 mg
Tá dược: Beta cyclodextrin, Mannitol, Natri bicarbonat, Dinatri hydrophosphat khan, Bột mùi dâu, Aspartam, Nước tinh khiết.
Nước tinh khiết sẽ mất đi trong quá trình sản xuất.

DẠNG TRÌNH BÀY:

Hộp 30 gói x 1 g.

DƯỢC LỰC:

Carbocistein là thuốc tiêu nhầy có tác dụng làm tiêu chất nhầy và giảm độ quánh của đờm ở phổi, tạo thuận lợi để tổng đờm ra ngoài bằng phản xạ ho.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Carbocistein hấp thu tốt qua đường tiêu hóa, nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được khoảng 2 giờ sau khi uống. Thuốc được phân bố vào mô phổi và chất nhầy đường hô hấp. Carbocistein được đào thải vào nước tiểu dưới dạng không đổi và chuyển hóa. Acetyl hóa, khử carboxyl và sulfon hóa là các con đường chuyển hóa chính của thuốc.

CHỈ ĐỊNH:

Điều trị các bệnh lý đường hô hấp có đờm nhầy quánh như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ho mạn tính.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Loét dạ dày.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Buồn nôn, khó chịu, chảy máu đường tiêu hóa.
- Phát ban da, ngứa, sưng (đặc biệt là ở mặt, lưỡi, cổ họng), chóng mặt, khó thở.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

THH0016-3

LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:

Dùng đường uống.

- Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi: 1 - 2 gói/ ngày.
- Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 1 gói/ lần, 3 lần/ ngày.

THẬN TRỌNG:

- Người bệnh có tiền sử loét dạ dày - tá tràng vì nguy cơ thuốc tiêu nhầy có thể phá hủy hàng rào niêm mạc dạ dày.
- **Phụ nữ có thai:** chưa có tài liệu khoa học chứng minh tính an toàn khi dùng thuốc cho phụ nữ mang thai. Do đó tốt nhất không nên dùng thuốc, đặc biệt trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nếu cần thiết, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
- **Phụ nữ đang cho con bú:** chưa có tài liệu chứng minh thuốc qua được sữa mẹ và gây hại cho trẻ bú mẹ. Tuy nhiên tốt nhất không nên dùng thuốc cho đối tượng này để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- **Tác động của thuốc đến khả năng lái xe và vận hành máy móc:** thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có ghi nhận về các thuốc có tương tác với carbocistein.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Dùng quá liều carbocistein gây ra đau bụng.

Xử trí: điều trị triệu chứng. Chưa có ghi nhận về biện pháp giải độc đặc hiệu.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: dưới 30⁰C, tránh ẩm và ánh sáng.

THH0016-3



IMEXPHARM

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline: 1800.555.535

E-mail: imp@imexpharm.com