

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

**IMEXFLON<sup>®</sup>**

GMP WHO

**VIÊN NÉN BAO PHIM**

**THÀNH PHẦN:**

Mỗi viên nén bao phim chứa:

Diosmin ..... 450 mg  
Hesperidin ..... 50 mg  
Tá dược: Lactose, Povidon, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol, Titan dioxid, Iron oxid red, FD&C yellow 5 lake.

**DẠNG TRÌNH BÀY:**

Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim.

**DƯỢC LỰC:**

Imexflon là sản phẩm phối hợp giữa diosmin và hesperidin, giúp tăng trương lực tĩnh mạch và bảo vệ mạch. Thuốc tác dụng lên hệ thống mạch máu trở về tim theo cơ chế:

- Làm giảm sự căng trương và tình trạng ứ trệ của tĩnh mạch.
- Bình thường hóa tính thấm mao mạch và sức bền mao mạch.

**DƯỢC ĐỘNG HỌC:**

Ở người, sau khi uống chất có chứa diosmin đánh dấu bởi C<sup>14</sup>, có ghi nhận sau:

- Bài xuất chủ yếu qua phân, trung bình có 14% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu.
- Thời gian bán thải là 11 giờ.
- Thuốc được chuyển hóa hoàn toàn do tìm thấy những acid phenol trong nước tiểu.

**CHỈ ĐỊNH:**

- Điều trị những triệu chứng liên quan tới suy tĩnh mạch - mạch bạch huyết (như nặng chân, đau chân).
- Điều trị những triệu chứng liên quan đến cơn trĩ cấp.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.  
Phụ nữ có thai và cho con bú.

**TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:**

Đã có báo cáo về một số trường hợp rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy, nhức mắt và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ, không cần ngưng điều trị.

**Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.**

**LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG:**

-Điều trị cơn trĩ cấp: uống 3 viên x 2 lần/ngày trong 4 ngày đầu; sau đó uống 2 viên x 2 lần/ngày trong 3 ngày tiếp theo.

**TTM0027-1**

- Phòng ngừa tái phát trĩ nội: uống 1 viên x 2 lần/ngày trong 3 tháng.
- Điều trị trong các bệnh do suy tĩnh mạch gây ra: uống 1 viên x 2 lần/ngày trong 2 tháng.

**THẬN TRỌNG:**

- Khi điều trị cơn trĩ cấp:
  - Việc dùng thuốc không thay thế cho điều trị đặc hiệu chữa các bệnh chứng khác của hậu môn.
  - Nếu các triệu chứng không mất đi nhanh chóng, cần tiến hành khám hậu môn và xem lại cách điều trị.
- Phụ nữ có thai:** Hiện nay, chưa có tài liệu nghiên cứu cho thấy thuốc có gây hại cho thai nhi. Bệnh nhân đang mang thai hay có ý định mang thai cần hỏi ý kiến bác sĩ để cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ trước khi sử dụng thuốc vì mục đích an toàn.
- Phụ nữ đang cho con bú:** Chưa có dữ liệu về việc thuốc có bài tiết vào sữa mẹ hay không. Tuy nhiên, bệnh nhân nên ngưng cho con bú khi sử dụng thuốc để đảm bảo tính an toàn cho trẻ.
- Tác động của thuốc lên khả năng lái tàu xe và vận hành máy móc:** Chưa có tài liệu cho thấy thuốc tác động đến khả năng lái tàu xe và vận hành máy móc.

**TƯƠNG TÁC THUỐC:**

- Hiện nay, chưa có tài liệu ghi nhận về sự tương tác của thuốc. Ngoài ra, chưa cho thấy có sự thay đổi nào có ý nghĩa thống kê về các thông số xét nghiệm như tổng số tế bào hồng cầu, haemoglobin, hematocrit, cholesterol, triglycerid, glucose và chức năng gan (SGPT, SGOT).
- Bệnh nhân cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ nếu đang điều trị với bất cứ thuốc nào khác.

**QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:**

Chưa có tài liệu ghi nhận về trường hợp quá liều và cách xử trí.

**ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.**

**NẾU CẦN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.**

**HẠN DÙNG:** 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

**BẢO QUẢN:** dưới 30°C, tránh ẩm và ánh sáng.

**TTM0027-1**



**IMEXPHARM**

Sản xuất tại: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM**

Số 04, Đường 30/4, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline: 1800.555.535

E-mail: [imp@imexpharm.com](mailto:imp@imexpharm.com)